



INSTRUCCIONES DE COMIDA Y LIQUIDOS

Estas instrucciones son enforzadas estrictamente para la seguridad de su niño(a).

Comidas y/o líquidos que sean consumidos despues de la hora índicada puede resultar en que el procedimiento de su niño(a) sea retrasado o cancelado.

- **TODA COMIDA SOLIDA** debe ser descontinuada despues de la medianoche.
- **LECHE DE PECHO** debe ser descontinuada 6 horas antes de la cirugía.
- **FORMULA INFANTIL O CUALQUIER OTRO TIPO DE LECHE** debe ser descontinuada 8 horas antes de le cirugía.
- **LIQUIDOS CLAROS** deben ser descontinuos 2 horas antes de la cirugía. Líquidos claros incluyen agua, Pedialyte (suero), Gatorade, sodas claras (Sprite), Powerade, jugo de manzana (sin pulpa o cidra).

Si usted tiene preguntas, necesita clarificación o tiene alguna preocupación, por favor contacte el Departamento de Pre-Anestesia de CHOA (Children's Healthcare of Atlanta) donde le van a hacer el procedimiento a su niño(a):

- Scottish Rite: 404-785-2555
- Egleston: 404-785-6712
- Centro Quirurgico Ambulatorio de Meridian Mark: 404-785-5615
- Centro Quirurgico Ambulatorio de Satellite Blvd: 404-785-8134